



Edward D. Hill
Director

Milton Teske, M.D.
Health Officer

To promote and protect the health and well-being of Kings County residents through education, prevention, and intervention.



PARA PUBLICACION INMEDIATA
FECHA: 26 de abril, 2021

Contacto: Departamento de Salud Publica, 559-852-4991
EMAIL: KCDPH.PIO@co.kings.ca.us

La vacuna Johnson & Johnson para COVID-19 es determinada segura para su uso

Hanford, CA – El sábado 24 de abril de 2021, el Grupo de Trabajo de Revisión de Seguridad Científica de los Estados Occidentales publicó un Resumen de Discusión y Hallazgos que concluye que la vacuna de Johnson & Johnson para COVID-19 es "generalmente segura y efectiva y que se justifica la reanudación de su uso". Este anuncio viene después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron un comunicado de prensa conjunto que levanta la pausa recomendada de la vacuna luego de una revisión de seguridad exhaustiva.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emitió la siguiente declaración de la Dra. Erica Pan, epidemióloga estatal: "Después de una revisión exhaustiva de eventos adversos muy raros después de la vacuna Johnson & Johnson, el Grupo de trabajo de revisión de seguridad científica de los estados occidentales apoya la recomendación de la FDA y los CDC para levantar la pausa en la vacuna. Las clínicas en California pueden comenzar a administrar la vacuna Johnson & Johnson de inmediato, siempre que proporcionen materiales educativos apropiados para informar a los pacientes sobre el bajo riesgo de efectos asociados para la salud de la vacuna y otras opciones de vacunas disponibles."

El Departamento de Salud Pública del Condado de Kings (KCDPH) volverá a comenzar a administrar la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson en los próximos días, proporcionando a los residentes del Condado de Kings una opción de vacuna adicional.

"La vacuna Johnson & Johnson ofrece la opción de una sola inyección contra COVID-19 y se ha determinado que los beneficios superan los riesgos asociados con esta vacuna en particular", dijo Edward Hill, director de KCPDH. "Las personas deben considerar sus opciones al seleccionar qué vacuna será mejor para ellos y tener en cuenta los posibles efectos secundarios, como es el caso de cualquier otra vacuna o medicamento."

Se han administrado más de 7,9 millones de dosis de la vacuna para COVID-19 de Johnson & Johnson a nivel nacional y, hasta el viernes 23 de abril de 2021, se habían reportado 15 casos de síndrome de trombosis-trombocitopenia (STT). En estos casos, los síntomas comenzaron aproximadamente 1-2 semanas después de la vacunación y la mayoría eran mujeres menores de 50 años. **Las personas deben buscar atención médica de inmediato si desarrollan los siguientes síntomas varios días después de recibir la vacuna: dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón de las piernas, dolor abdominal persistente, dolores de cabeza intensos o visión borrosa, ardor en los ojos o pequeñas manchas de sangre debajo de la piel más allá del lugar de la inyección.**